



Erzwespen gegen Napfschildläuse



Bild: Entomare C.V.

25 Stk.

Coccin | Erzwespen gegen Napfschildläuse

Pflanzenschutzmittel, Insektizid (Pfl. Reg. Nr. 3041-0). Für die Verwendung im Haus- und Kleingartenbereich zulässig.
Nennfüllmenge / Wirkstoffgehalt / Art der Formulierung: 25 adulte Weibchen der Erzwespe *Microterys nietneri*.

Wirkungsweise

Die zwei Millimeter große *Microterys nietneri* Erzwespe (vormals *Microterys flavus*) parasitiert die häufig auftretende Gemeine Napfschildlaus (*Parthenolecanium corni*). Die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Insekt erfolgt im Schädling, der dadurch abgetötet wird.

Einsatzgebiet

Schädling	Kultur	Anwendungsbereich
Gemeine Napfschildlaus	Zierpflanzenkulturen	Unter Glas, Büroräume, Wohnräume, Wintergärten

Aufwandmenge

in Abhängigkeit der Pflanzengröße	
bis 50 cm:	2 – 8 Individuen / m ²
bis 125 cm:	4 – 12 Individuen / m ²
über 125 cm:	5 – 15 Individuen / m ²

Anwendung

Voraussetzungen:

Da diese Erzwespe eine längere Tageslichtlänge als andere Nützlinge benötigt, ist eine Anwendung zwischen März und Oktober im Innenraum und unter Glas bei einer Mindesttemperatur von 18 °C empfehlenswert.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Anwendungszeitpunkt:

Bei Befall bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen, Wiederholungen nach Bedarf in 14-tägigen Abständen.

Anwendungsort:

Ausbringung durch Freilassen aus den Transportbehältern.

Ausbringung:

1. Je nach Befall: ggf. Rückschnitt der befallenen Pflanzenteile und Vorbehandlung der Pflanzen mit Paraffinöl (Wartezeit beachten).
2. Erzwespen bei den befallenen Pflanzen freilassen.
3. Gegebenenfalls ist an den behandelten Pflanzen eine zusätzliche Ameisenbekämpfung durchzuführen.

Vorsicht, Pflanzenschutzmittel! Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Für Kinder und Haustiere unerreichbar aufbewahren. Originalverpackung oder entleerte Behälter nicht zu anderen Zwecken verwenden.

Lagerung

Sofort ausbringen oder maximal zwei Tage zwischen 10 – 15 °C lagern.

Kombinierbarkeit

Das Pflanzenschutzmittel (Nützlingspräparat) ist nicht uneingeschränkt mit chemischen Pflanzenschutzmaßnahmen kombinierbar. Vor und während der Freilassung darf innerhalb einer angemessenen Frist kein nützlingsgefährdendes Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Kombinationen mit anderen Nützlingen sind generell möglich, und in einigen Fällen sinnvoll. Die Fachberatung der Firma biohelp Garten & Bienen gibt hier gerne Auskunft zu jedem speziellen Fall!

Sonstige Hinweise und Auflagen

Die Angaben zu Aufwandmenge, Anwendungszeitpunkt, maximale Anzahl der Anwendungen und zeitlicher Abstand in Tagen stellen Richtwerte dar und können gegebenenfalls in Verantwortung des Verwenders an die betriebs- und kulturspezifische Situation angepasst werden.

Entsorgung

Verpackung nicht wieder verwenden und auf gesicherte Weise entsorgen.

Qualitätskontrolle

Bei den Nützlingen handelt es sich um lebende Organismen, die unsere Firma in einwandfreier Qualität verlassen. Verzögerungen im Versand bzw. bei der Abholung beeinträchtigen die Qualität der Organismen und schränken die Erfolgsaussichten massiv ein. Bei Wirkungsverlusten durch unsachgemäße Anwendung, Lagerung oder transportbedingten Verzögerungen lehnt die biohelp Garten & Bienen GmbH jegliche Haftung ab.

Herstellungsdatum

Siehe Aufdruck auf dem Produkt.



Sofort ausbringen
oder max. 2 Tage
bei 10 – 15 °C lagern!

Kühl lagern! ❄️❄️❄️

www.garten-bienen.at

Zulassungsinhaber & Fachberatung:

biohelp Garten & Bienen GmbH

Kaplegasse 16 · 1110 Wien | +43 (0)1 767 98 51

office@garten-bienen.at