

Nematop Käfer-Stopp - Nematoden gegen Dickmaulrüssler für 10 m²

Art-Nr.: 60147 / GTIN: 9120051960090 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)




21,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2	20,50 EUR - Du sparst 1,40
Stk	EUR
Ab 3	20,00 EUR - Du sparst 1,90
Stk	EUR
Ab 5	19,00 EUR - Du sparst 2,90
Stk	EUR

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026** | Abholung: nach Benachrichtigung!
Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert sich laufend - C&C Bestellung für Abholung nötig)



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

3278-0

Produktinformation

Schlagworte:	Dickmaulrüsslerkäfer, Dickmaulrüsslerlarven, Larven, Käfer, Nematoden, Fadenwürmer, Fangbrett, Brett, Nematop, Gel, Heterorhabditis bacteriophora sp., Parasitierung, Nematop Käfer-Stopp, Außenraum, Biohelp Garten und Bienen, biohelp, GuB
Einsatzgebiet:	Freiland
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Anwendungszeitraum:	Frühjahr, Sommer, Herbst
Schaderreger:	Dickmaulrüssler
Ausbringung:	Auslegen
Min. Temperatur:	12 °C
Wirkstoff (PSM):	Nützling



Hinweis

Es handelt sich bei dem Produkt um eine "Infektionsstation" unter der sich der Dickmaulrüssler mit den Nematoden infizieren kann, nicht jedoch um eine "Falle". Aus diesem Grund finden Sie unter dem Brett auch keine toten Käfer. Näheres siehe "Wirkungsweise".

Art

Steinernema carpocapsae

Wirkungsweise

Dickmaulrüssler sind nachtaktive Insekten, tagsüber suchen sie sich einen geschützten Platz. Diese Tatsache nützen wir und bieten dem Käfer mit der speziellen Infektionsstation einen geeigneten Unterschlupf an. Während des Aufenthaltes unter der Infektionsstation (hierbei genügen schon wenige Minuten) können die Nematoden in den Rüssler eindringen. Nach spätestens einer Woche sind die befallenen Insekten tot.

Anwendung

Bei akutem Befall von Anfang Mai bis Ende September. Mindesttemperatur: 12° C

- Nematop Käfer-Stopp aus der Plastikverpackung nehmen und einfach mit den Öffnungen der Nuten nach unten unter die befallenen Gehölze legen.
- Die Nematoden sind nach dem Aufstellen des Brettes ca. 6 Wochen aktiv.

Aufwandmenge

2,5 Mio. Nematoden (= 1 Brett) sind ausreichend für 10 m².

- Brett ca. 135x105x20mm

Vorsicht bei Umlegen der Infektionsstation!

Gel kann im trockenen Zustand porös sein und leicht herausfallen.

Kombination

Produktinformation

Eine Kombination mit Rüssler-Stopp ist empfehlenswert, da in diesem Falle beide Stadien, also die Larven und die erwachsenen Käfer bekämpft werden.

Rüssler-Stopp gegen Dickmaulrüssler-Larven

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung beachten!

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

Produktinformation

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.