

Vorteilspaket: Dickmaulrüssler Kombi für 100 m²

Art-Nr.: 70067 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



56,00 EUR / Set

Einzelpreis 66,80 EUR (Du sparst 10,80 EUR)

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026** | Abholung: nach Benachrichtigung



Produktinformation

Mindestbodentemperatur 12 °C! Bis zum aufgedruckten MHD im Kühlschrank lagerbar

Das Kombi-Powerpaket zur Dickmaulrüsslerbekämpfung

Das Paket beinhaltet Nematoden-Produkte zur biologischen Bekämpfung der Larven und Käfer

Beschreibung

Der Dickmaulrüssler ist unter all den ungebeten Gästen im Garten sicher einer der hartnäckigsten. Häufig werden seine Eier und Larven bereits mit neuen Pflanzen oder Substraten eingeschleppt oder er wandert aus der Nachbarschaft zu. Die nachtaktiven Käfer fressen typische halbmondförmige Buchten in die Blattränder. Bevorzugt werden dabei v.a. hartlaubige Pflanzen wie Rhododendron, Kirschlorbeer, Azaleen, Rosen, Efeu und Eiben. Die Fraßschäden der Käfer sind zwar unschön, für die Pflanze aber keine ernsthafte Bedrohung. Die weitaus größere Gefahr geht von den Larven aus, die an den Wurzeln der Pflanzen fressen, diese allmählich schwächen und im schlimmsten Fall zum Absterben bringen. Mit dem Vorteilspaket Dickmaulrüssler Kombi können beide Entwicklungsstadien (Larven und Käfer) auf biologische Weise bekämpft werden. Natürliche Gegenspieler der Dickmaulrüssler wie Laufkäfer, Spitzmäuse und Igel werden geschont..

Inhalt

- ul {list-style-type: disc ;}
- 1x Rüssler-Stopp 50 Mio. für max. 100 m² – zur Bekämpfung der Dickmaulrüssler-Larven im Boden (ab 12 °C Bodentemperatur)
- 1x Nematop-Käferstopp für max. 10 m² – Infektionsstation zur Bekämpfung der Dickmaulrüssler-Käfer

Anwendung

- ul {list-style-type: disc ;}
- Bekämpfung der Larven: Nematodenpulver laut Gebrauchsanweisung mit Wasser vermischen und in den Boden um die befallenen Pflanzen eingießen. Achtung: Nematoden sind UV-empfindlich, daher am besten bei bewölktem, regnerischem Wetter oder in den Abendstunden ausbringen. Mindestbodentemperatur: 12°C, ansonsten findet keine Bekämpfung statt.
- Bekämpfung der Käfer: Die Käfer selbst sind nachaktiv, untertags suchen sie einen geschützten Platz auf. Dieses Verhalten macht sich die Infektionsstation Nematop-Käferstopp zunutze. Auf der Unterseite des Brettes befindet sich ein Nematodengel, mit dem sich die Käfer bei Kontakt infizieren und innerhalb weniger Tage absterben.

Anwendungszeitraum

Frühjahr (April/Mai) und Herbst (Mitte August – Anfang Oktober bzw. so lange die Bodentemperatur über 12°C beträgt)

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und

Produktinformation

verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.