

Dany's Bienenwohl® 1000 g

Art-Nr.: 70100 / GTIN: 4260189920124 / Hersteller: [Salzburger Imker Genossenschaft reg.Gen.m.b.H](#)

42,50 EUR / Stk

Unser alter Preis ~~47,90 EUR~~ (Du sparst 5,40 EUR)

inkl. 10% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
~~Do. 06. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)



Schlagworte:

Imkerei, Bienen, Biene, Apis mellifera, Bienenvolk, Honigbiene, Bienenstock, Imkerei, Varroamilbe, Varroabefall, Varroose, Milbe, Messung, Messung Varroabefall, Oxalsäure, Träufeln, Varroa, Kunstschwärme, Brutableger, Winterbehandlung

Anwendungszeitraum: Winter
Wirkstoff: Oxalsäure
Anwendungsfertig (AF): nein
Art der Behandlung: Träufeln



Produktinformation

MHD 01/27

Hinweis

Dany's Bienenwohl® Pulver und Lösung zur Herstellung einer Dispersion (39,4 mg/ml) zur Anwendung im Bienenstock in brutfreien Völkern gegen Varroamilben

Detaillierte Anwendungsinformationen sowie Hinweise zu Gegenanzeigen und allfälligen Wechselwirkungen entnehmen Sie bitte der Anleitung im Downloadbereich.

Beschreibung

Eine Flasche mit 750 g Oxalsäure-Dihydrat-Lösung und zwei Beutel (zu je 125 g) Saccharosepulver zur Herstellung von 888 ml Dispersion zur Anwendung im Bienenstock. Pulver und Lösung zur Herstellung einer Dispersion (39,4 mg/ml) zur Anwendung im Bienenstock.

Anwendung/Dosierung

Leichte Anwendung durch einfaches Träufeln in die besetzte Wabengasse.

Herstellung der Dispersion:

- ul {list-style-type: disc ;}
- Den Inhalt des Beutels / der Beutel vollständig in die Flasche mit der Lösung füllen. Flasche mit Lösung soll zum Zeitpunkt des Ansetzens 30-35 °C warm sein. Flasche fest verschließen und so lange schütteln, bis sich die Saccharose aufgelöst hat. Die fertige Dispersion mittels Schwanenhals Aufsatz (separat erhältlich) in den besetzten Wabengassen mit einem Zug ohne Druck aufträufeln.
- Mengenaufwand: je nach Volkstärke ungefähr 5 ml bis 6 ml pro besetzter Wabengasse.
- Die Behandlung der Bienenstöcke sollte am Spätnachmittag oder abends und bei einer Außentemperatur von über 5°C aber nicht über 28 °C erfolgen.
- Besonders zu empfehlen bei der Erstellung von Kunstschwärmen, in der brutfreien Zeit bei Brutablegern und zur Winterbehandlung.

Anwendungszeitraum

Spätnachmittag oder abends und bei einer Außentemperatur von über 5 °C aber nicht über 28 °C erfolgen.

- ul {list-style-type: disc ;}
- Winterbehandlung
- Kunstschwärme/Naturschwärme
- Totale Brutentnahme

Hinweis

Keine negativen Auswirkungen auf Bienen, Brut oder Königin, keine Resistenzbildung, keine Rückstände, keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich, kein HMF - durch eigenes Ansetzen.

Aufsatz zum Träufeln

Schwanenhals-Dosierverschluss zur Träufelbehandlung

Zulassungsnummer: EU/2/18/225/001-002
