

Produktinformation

Hypoaspis - 5.000

Art-Nr.: 30176 / GTIN: 9120051961103 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)




27,40 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2	25,21 EUR - Du sparst 2,19
Stk	EUR
Ab 3	24,66 EUR - Du sparst 2,74
Stk	EUR

Versand voraussichtlich: **Di, 11. Aug.** -
Abholung: nach **Mo, 12. Aug. 2020** | Abholung: nach



Pflanzenschutzmittel-
Registernummer:

4305-0

Schlagworte:

Raubmilbe, Hypoaspis, Trauermücke, Thripslarve, Wurzelgallennematode,
Bodenschädlinge, Indoor, Nützling

Produktinformation

Anwendungsart:	kurativ (bei Befall), präventiv (vorbeugend)
Schaderreger:	Thrips, Trauermücke, Wurzelgallennematode
Einsatzgebiet:	Freiland, Unter Glas / Gewächshaus
Anwendungsbereich:	Obst- & Gemüsepflanzen, Zierpflanzen
Anwendungsfertig (AF):	ja
Ausbringung:	Streuen
optimale Luftfeuchte:	65 %
Min. Temperatur:	15 °C
Max. Temperatur:	35 °C
Befallsstärke:	präventiv, schwach, mittel
Opt. Temperatur:	20-27°C
Wirkstoff (PSM):	Nützling



© Koppert Biological Systems

Art und Hinweis

Hypoaspis miles. Raubmilben benötigen zumind. 15 °C auch über Nacht, um effektiv wirken zu können!

Wirkungsweise

Hypoaspis-Raubmilben leben im Boden und haben ein sehr breit gefächertes Nahrungsspektrum. Vor allem Trauermückenlarven, Thripse, Wurzelläuse und Wurzelgallnematoden werden gefressen. Eine Besonderheit dieser kleinen Räuber ist, dass sie lange (mehrere Wochen) ohne Nahrung auskommen können, daher ist auch eine vorbeugende Behandlung möglich. Die Entwicklung vom Ei bis zum erwachsenen Tier dauert bei 20°C rund 15 Tage (abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit). Die Raubmilben sind für mehrere Wochen aktiv. Bei günstigen Bedingungen besteht zudem die Möglichkeit, dass die Raubmilben Populationen bilden und sich langfristig ansiedeln.

Anwendung

Kultursubstrat leicht anfeuchten (am besten mit Wasser leicht ansprühen). Packung erst bei den Pflanzen öffnen, Inhalt gut durchmischen und zur einfacheren Ausbringung in einen Behälter geben.

Raubmilbengemisch breitflächig, aber dünn auf der Erdoberfläche oder dem Substrat verteilen. Leere Packung mindestens eine Woche im Bestand lassen, damit darin verbliebene Raubmilben auswandern können.

- ul {list-style-type: disc ;}
- kleinere Töpfe unter 10L - 1 EL
- größere Töpfe über 10L - 2 EL
- vorbeugend 50-500 Milben / m²
- bei Befall 500-1.000 Milben / m²

5.000 Bodenraubmilben sind ausreichend für 5-10m²

Anmerkung

Produktinformation

- ul {list-style-type: disc ;}
- Die Anwendung ist bei einer Temperatur zwischen 15 und 35° C möglich.
- Optimale Temperatur: 18-25° C
- Luftfeuchtigkeit: > 65%
- Boden leicht feucht (nicht zu nass)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Produktinformation

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.