

Produktinformation

Varroxal 75g

Art-Nr.: 70194 / GTIN: 4260197991383 / Hersteller: [Andermatt BioVet](#)



35,90 EUR / Stk

inkl. 10% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
Do. 06. Aug. 2026 | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)

Schlagworte:

Imkerei, Bienen, Biene, Apis mellifera, Bienenvolk, Honigbiene, Bienenstock,
Imkerei, Varroamilbe, Varroabefall, Varrose, Milbe, Varroamilbe, Spritze, Oxalsäure,
Varrox Verdampfer, Oxalsäure-Dihydrat, verdampfen, träufeln, sprühen, Varroxal,
Oxalsäurenebel, Nebel, verdampfen, Verdampfer, Winterbehandlung,
Sommerbehandlung, Kontaktmittel

Wirkstoff:

Oxalsäure

Anwendungszeitraum: in der brutfreien Zeit, Sommer, Winter

Art der Behandlung: Sprühen, Träufeln, Verdampfen

Wartezeit für Honig: 0 Tage



Zur Überprüfung
der Legitimität
dieser Webseite
hier klicken

Produktinformation

Andermatt BioVet

Hinweis

Oxalsäure ist beim Einatmen für den Menschen extrem schädlich - BITTE AUSSCHLIEßLICH MIT GEEIGNETEM ATEMSCHUTZ (FFP3) ANWENDEN

Detaillierte Anwendungsinformationen sowie Hinweise zu Gegenanzeigen und allfälligen Wechselwirkungen entnehmen Sie bitte der Anleitung im Downloadbereich.

Wirkstoff

Oxalsäuredihydrat Pulver 0,71 g/g

Ohne Zuckerbeigabe

Inhalt

75 g Oxalsäuredihydrat Pulver (ausreichend für ca. 37 Bienenvölker).

Anwendung

Anwendung in brutfreien Völkern. Die Behandlung von Wirtschaftsvölkern ohne aufgesetzte Honigräume durchführen. Das Tierarzneimittel sollte nicht während der Tracht angewendet werden.

ul {list-style-type: disc ;}

- Verdampfung/Sublimation: Einmalige Behandlung im Herbst/Winter (2°C - max. 10°C Außentemperatur).
- Eine zweite Behandlung im Abstand von 2 Wochen wird nur bei stark befallenen Bienenvölkern von über 6% (>1 Varroamilbe pro Tag) empfohlen oder wenn während der ersten Behandlung noch kleine Flächen verdeckelter Brut vorhanden waren
- Träufelanwendung: Im Sommer nach der Honigernte oder im Herbst/Winter als einmalige Behandlung bei Außentemperaturen über 15°C.
- Sprühanwendung: In Schwärmen, Kunstschwärmen oder künstlich brutfreien Völkern als einmalige Behandlung im Frühjahr/Sommer oder im Herbst/Winter bei Außentemperaturen über 8 °C anwenden. Eine zweite Sprühbehandlung im Abstand von 2 Wochen wird nur bei stark befallenen Völkern mit einem Restbefall von über 6 % empfohlen.

Aufwandmenge

2 g Varroxal pro Volk

Wir empfehlen folgende Produkte:

Varrox Verdampfer zum Verdampfen von Oxalsäure

Schutzmaske Imkerei zum Schutz vor Sprühnebel & Stäuben

Schutzbrille Imkerei - zum Schutz bei Säurebehandlungen

Schutzhandschuhe Imkerei

Zulassung-Nr.: 841902
