

Bestellkarte "Bodenschädlinge 100 m²"

Art-Nr.: 99050 / GTIN: 9120051962407 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



52,00 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. -**
~~Do. 06. Aug. 2026~~ | Abholung: nach
Benachrichtigung!

Mehr als 10 Stk auf Lager (Menge ändert
sich laufend - C&C Bestellung für Abholung
notig)

Versand: nur innerhalb Österreichs

Wie funktioniert diese Bestellkarte?

So einfach kommen Sie zu Ihren Nützlingen: Diese Karte enthält einen Anforderungscode für Ihre Nützlingslieferung, die Sie bereits mit dem Kauf der Karte bezahlt haben. Lösen Sie den Code einfach und bequem online unter www.bestellkarte.at ein oder senden Sie alternativ die ausgefüllte Karte per Post oder E-Mail. Die Nützlinge werden anschließend versandkostenfrei an Ihre Wunschadresse geliefert.

Voraussetzungen für den Nützlingseinsatz

Anwendungszeitraum: abhängig vom Entwicklungszyklus der zu bekämpfenden Schädlinge sowie von der Bodentemperatur richtet sich der Zeitpunkt der Anwendung.

□ Bodentemperatur: Nematoden benötigen bestimmte Mindesttemperaturen, um wirksam zu sein, wobei die

Produktinformation

Temperatur in etwa 10 cm Tiefe gemessen wird.

☐ Bodenfeuchtigkeit: Wird die Erde zu trocken, werden die Nematoden unbeweglich, wodurch der Bekämpfungserfolg sinkt. Wichtig ist es daher darauf zu achten, dass das Erdreich für rund zwei Wochen nach der Behandlung gut durchfeuchtet bleibt.

Die Vorteile eines Nützlingseinsatzes

- ☐ ☐
 - ul {list-style-type: disc ;}
- Spezifische Wirkung: Nematoden haben keine Effekte auf Nicht-Ziel-Organismen wie Bienen, Schmetterlinge oder Regenwürmer.
- ☐ Keine Auswirkungen: auf Menschen oder Haustiere wie Hunde oder Katzen, da es sich um insektenpathogene Nützlinge handelt.
- ☐ Unkomplizierte Anwendung: in Wasser aufgelöst, lassen sich die Nematoden einfach ausgießen.

Wissenswertes über Nematoden: Nematoden sind mikroskopisch kleine Fadenwürmer, die in die Schädlingslarven eindringen und ihr symbiotisches Bakterium absondern, welches die Larven abtötet. Die Fadenwürmer vermehren sich in der Larve so lange, bis diese aufbricht und die Nematoden die nächste Larve infizieren können. Dieser Ablauf setzt sich so lange fort, bis die Schädlingspopulation deutlich reduziert ist.

Ausgewählt werden kann

Bitte nur ein Produkt ankreuzen!

- ☐ ☐
 - ul {list-style-type: disc ;}
 - HB-Nematoden gegen Dickmaulrüssler-Larven 50 Mio. Rüssler-Stopp* (Heterorhabditis bacteriophora sp.) Pfl.Reg.Nr. 4249-901 (Anwendung: April – Juni + Ende August – Anfang Oktober)
 - HB-Nematoden gegen Maikäfer-Larven 50 Mio. Engerling-Stopp* (Heterorhabditis bacteriophora sp.) Pfl.Reg.Nr. 4249-0 (Anwendung: August/September im Flugjahr; im darauffolgenden Jahr im April/Mai)
 - HB-Nematoden gegen Junikäfer-Larven 50 Mio. Engerling-Stopp* (Heterorhabditis bacteriophora sp.) Pfl.Reg.Nr. 4249-0 (Anwendung: August – September im Flugjahr)
 - HB-Nematoden gegen Gartenlaubkäfer-Larven 50 Mio. Engerling-Stopp* (Heterorhabditis bacteriophora sp.) Pfl.Reg.Nr. 4249-0 (Anwendung: Juli – September)
 - SC-Nematoden gegen Maulwurfsgrielen 50 Mio. Nema-Stopp* (Steinernema carpocapsae) Pfl.Reg.Nr. 4512-0 (Anwendung: zwei Ausbringungen in 2 aufeinanderfolgenden Jahren im April – Juni)
 - SC-Nematoden gegen Wiesenschnaken-Larven 50 Mio. Nema-Stopp* (Steinernema carpocapsae) Pfl.Reg.Nr. 4512-0 (Anwendung: September – Oktober)
-