

Vespi-Thrips - räuberischer Thrips gegen Schadthripse | 150 Stk.

Art-Nr.: 10633 / GTIN: 9120051962636 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](https://www.biohelp-garten-bienen.de)



29,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand und 5,00 EUR
Aufschlag für Expressversand

Staffelpreise

Ab 2	28,90 EUR - Du sparst 1,00
Stk	EUR

Versand voraussichtlich: **Di, 11. Aug.** -
Mo, 12. Aug. 2026 | Abholung: nach
Benachrichtigung!



Produktinformation

Pflanzenschutzmittel-Registernummer:	4643-0
Schlagworte:	Vespi-Thrips, Franklinothrips, Franklinothrips vespiformis, räuberischer Thrips, Raubthrips, Thripsbekämpfung
Anwendungszeitraum:	Frühjahr, Sommer
Anwendungsart:	kurativ (bei Befall)
Schaderreger:	Thrips
Min. Temperatur:	18 °C
Max. Temperatur:	30 °C
Ausbringung:	Auslassen im Bestand
Einsatzgebiet:	Balkon, Freiland, Innenraum, Unter Glas / Gewächshaus
Wirkstoff (PSM):	Nützling
optimale Luftfeuchte:	50-80%

© Andermatt Nederland bv

Achtung

Während der Sommermonate bieten wir für diesen Nützling aufgrund der höheren Temperaturen ausschließlich Selbstabholung und Express-Versand an (5,00€ Aufschlag für Expresslieferung werden beim Checkout berechnet).

Art

Franklinothrips vespiformis

Wirkungsweise

Vespi-Thrips ist eine räuberische Thripsart, die zur biologischen Bekämpfung schädlicher, blattbewohnender Thripse eingesetzt werden kann. Die adulten räuberischen Thripse ähneln Ameisen. Die Larven sind zunächst durchscheinend weiß, färben sich aber nach einiger Zeit leuchtend rot. Trotz ihrer Farbe sind die Larven in der Pflanze schwer zu finden. Sowohl die Larven als auch die adulten Tiere gehen aktiv auf Nahrungssuche. Sie ernähren sich von den Larven und adulten Stadien der schädlichen Thripse, was zu einer Reduzierung der Schädlingsdichte führt. Der Aufbau der Population räuberischer Thripse dauert mindestens fünf bis sechs Wochen.

Anwendungsart

Den Inhalt des Behälters über die Pflanzen streuen oder in die Bio Box leeren und diese an der Pflanze anbringen.

Wichtig: die Nützlinge direkt auf die Pflanze streuen und nicht auf das Substrat. Wenn sich die Nützlinge auf dem Boden befinden, kommen sie nicht mehr auf die Pflanzen zurück. Geeignet für den Einsatz auf Zierpflanzenkulturen wie Zimmerpflanzen und Zierpflanzenbau Hanf, Gemüsekulturen, Himbeeren, Brombeeren, Kultur-Heidelbeere, Erdbeeren im Freiland und unter Glas.

Produktinformation

Anwendungszeitraum

- ul {list-style-type: disc ;}
- März-September, im Winter wegen Temperatur und Tageslänger weniger aktiv
- Temperatur: 18-30°C
- Luftfeuchte 50-80%

Aufwandmenge

max. 15 Individuen /m², bei Bedarf Anwendung nach 14 Tagen wiederholen.
bei Befall bzw. Sichtbarwerden der ersten Symptome bzw. Schadorganismen

Amblymite (Amblyseius swirskii)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden! Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

10 Tipps

10 Tipps

zur sachgerechten Anwendung von Pflanzenschutzmitteln im Haus- und Kleingarten. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen beim sicheren und verantwortungsvollen Umgang.

1. Fachliche Beratung nutzen

Lassen Sie sich beim Kauf von Pflanzenschutzmitteln von geschultem Fachpersonal beraten. Eine gute Beratung hilft, die Ursache eines Pflanzenschadens richtig zu erkennen und die passende Behandlung sowie mögliche Alternativen auszuwählen.

2. Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen

Lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam. Beachten Sie Vorsichtsmaßnahmen, Sicherheits- und Anwendungshinweise sowie eventuelle Einschränkungen, z. B. Wartezeiten bei essbaren Kulturen.

3. Anwenderschutz beachten

Schützen Sie sich bei der Anwendung durch geeignete Kleidung. Festes Schuhwerk, körperbedeckende Kleidung und bei Bedarf Handschuhe gehören zur Grundausstattung. Beachten Sie auch die Hinweise in der Gebrauchsanleitung.

4. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen

Während der Anwendung von Pflanzenschutzmitteln sollte grundsätzlich nicht gegessen, getrunken oder geraucht werden.

5. Richtige Dosierung und Menge verwenden

Achten Sie auf die empfohlene Dosierung und Ausbringungsmenge. Bereiten Sie nur so viel Spritzlösung vor, wie tatsächlich benötigt wird. Eventuelle Restmengen können im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und auf bereits behandelten Flächen ausgebracht werden.

Produktinformation

6. Den richtigen Anwendungszeitpunkt wählen

Der Behandlungserfolg hängt stark vom Zeitpunkt ab. Beachten Sie Faktoren wie Pflanzenwachstum, Vegetationsperiode, Tageszeit, Witterung und möglichen Bienenflug. Auch Regen kann die Wirkung beeinträchtigen.

7. Umwelt schützen

Halten Sie Abstand zu Oberflächengewässern ein und vermeiden Sie Abdrift. Spritzen Sie möglichst bei Windstille und nicht bei Temperaturen über 25 °C. Herbizide dürfen nicht auf versiegelten Flächen eingesetzt werden.

8. Geräte nach der Anwendung reinigen

Reinigen Sie Spritzgeräte nach jeder Anwendung gründlich. Spülen Sie Geräteteile mehrfach mit Wasser und bringen Sie das Spülwasser auf zuvor behandelten Flächen aus. Altbestände und nicht mehr verwendbare Restmengen gehören zur Problemstoffsammlung.

9. Haut und Kleidung reinigen

Waschen Sie betroffene Hautstellen nach der Arbeit gründlich mit Wasser und Seife. Verunreinigte Kleidung sollte gewechselt und vor erneutem Gebrauch gewaschen werden.

10. Pflanzenschutzmittel richtig lagern

Lagern Sie Pflanzenschutzmittel immer in der Originalverpackung und außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren. Angebrochene Packungen dicht verschließen und vor Hitze, Frost und Feuchtigkeit schützen.
