

Ameisen-Stopp - SF-Nematoden gegen Ameisen für 50m² oder 50 Nester

Art-Nr.: 20128 / GTIN: 9120051962629 / Hersteller: [biohelp Garten & Bienen](#)



44,90 EUR / Stk

inkl. 20% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 2	40,00 EUR - Du sparst 4,90
Stk	EUR
Ab 3	37,00 EUR - Du sparst 7,90
Stk	EUR

📦 Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. - Mo. 10. Aug. 2026** | Abholung: nach 2 Stk auf Lager (Menge ändert sich laufend - C&C Bestellung für Abholung nötig)



Produktinformation

Schlagworte: Ameisen-Stopp, Steinernema feltiae, Nematoden, Fadenwürmer, Ameisen, Nester, Parasiterung

Nematoden: © Koppert Biological Systems

Nematoden-Art

Steinernema feltiae

Wirkungsweise

Steinernema feltiae sind ca. 0,5mm lange Fadenwürmer, die in die Nester der Ameisen gegossen werden. Nematoden sind natürliche Feinde von Ameisen. Daher meiden Ameisen Flächen, die mit Nematoden behandelt sind und verlegen ihre Nester an einen unbehandelten Platz.

Aufwandmenge

50 Mio. sind ausreichend für 50m² oder 50 Nester.

Anwendung

Die Anwendung ist einfach. Das Nematodenpulver wird in Wasser (15-20°C) aufgelöst und mit viel Wasser in Nester und Gänge gegossen. Besonders geeignet für Terrassen, Pflasterflächen, Pflanzegefäße und Gewächshäuser.

- ul {list-style-type: disc ;}

- Auf Rasenflächen müssen die Nematoden direkt in die Nester gegossen werden. Nur so kommen sie tief genug in den Boden um zu wirken.
- Bei Befall entlang von Hauswänden 2,5 Mio. Nematoden / Laufmeter

Die Erde nach der Anwendung für 14 Tage feucht halten. Bei Bedarf Wiederholung der Anwendung nach 6 Wochen.

Ausbringung

Bis zum aufgedruckten MHD im Kühlschrank lagerbar.

- ul {list-style-type: disc ;}

- Bodentemperatur: min. 8 °C für mehrere Stunden /Tag
 - UV-Strahlung (direktes Sonnenlicht) vermeiden: während & min. 2 Stunden nach der Ausbringung
 - Erdreich feucht halten: vor der Ausbringung gießen
 - Vorhandenes Mulchmaterial vor der Ausbringung entfernen
-