

Thymovar - zur Varroa-Sommerbehandlung | 10 Plättchen

Art-Nr.: 40002 / GTIN: 9120051962186 / Hersteller: [Andermatt BioVet](#)



30,90 EUR / Pkg

inkl. 10% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise

Ab 5 Pkg	30,50 EUR - Du sparst 0,40 EUR
Ab 10 Pkg	29,00 EUR - Du sparst 1,90 EUR
Ab 40 Pkg	27,00 EUR - Du sparst 3,90 EUR

Versand voraussichtlich: **Mi. 05. Aug. - Do. 06. Aug. 2026** | Abholung: nach Benachrichtigung

Mehr als 10 Pkg auf Lager (Menge ändert sich laufend - C&C Bestellung für Abholung nötig)



Produktinformation

Schlagworte:	Bienen, Biene, Apis mellifera, Bienenvolk, Honigbiene, Bienenstock, Imkerei, Varroamilbe, Varroabefall, Varrose, Milbe, Thymol, Streifen, Schwammtuchstreifen, Cellulose-Schwammtuch, Waben, Tracht, Zargen, Brutraum, Sommerbehandlung, Varroa destructor
Anwendungszeitraum:	nach der Honigernte, Sommer, Herbst
Wirkstoff:	Thymol
Varroa Befallsstärke:	gering, mittel
Anwendungsfertig (AF):	ja
Wartezeit für Honig:	0 Tage
Art der Behandlung:	Auflegen



Versand: nur innerhalb Österreichs

Bildquellen: Andermatt BioVet

Hinweis

Wartezeit Honig: 0 Tage Gegenanzeigen: Nicht anwenden bei Tagesmaximaltemperaturen über 30°C

Detaillierte Anwendungsinformationen sowie Hinweise zu Gegenanzeigen und allfälligen Wechselwirkungen entnehmen Sie bitte der Anleitung im Downloadbereich.

Wirkstoff

Thymol

Beschreibung

Thymovar® besteht aus Schwammtuchstreifen mit 15 g Thymol. Es kann bei geringer bis mittlerer Befallsstärke (Milbentotfall: 1 – 5 Varroamilben/Tag) eingesetzt werden. Der natürliche Wirkstoff Thymol ist für Varroamilben tödlich, für Brut und Königin aber sehr gut verträglich. Dank langer Behandlungszeit schützt Thymovar® vor eingetragenen Varroamilben. Wenn alle Anweisungen eingehalten werden, kann mit Thymovar® eine Wirkung von 80 – 90% erwartet werden.

Anwendung

Zuerst muss der Milbenbefall bestimmt werden, die erste Behandlung wird dringend erforderlich bei einem natürlichen Milbenbefall von mehr als 10 Milben pro Tag (betrifft ein Wirtschaftsvolk). Thymovar® wird nach der Honigernte eingesetzt. Die Plättchen auf dem Brutrahmen mit einem Abstand von 4 – 10 cm zur Brut platzieren, wobei bis zum Deckel ein Abstand von min. 0,5 cm sein sollte, optimal ist 1 cm. Thymovar® rund 3 – 4 Wochen liegen lassen, danach entfernen und das Bienenvolk wieder auffüttern. Nach dem Auffüttern kann mit der zweiten Anwendung, ebenfalls für 3 – 4 Wochen, begonnen werden. Die beste Wirkung entfaltet Thymol bei Tagestemperaturen zwischen 20 – 25°C. Um Räubereien vorzubeugen, sollten alle Völker gleichzeitig behandelt werden, außerdem sollte Thymovar® nicht vor oder während der Tracht eingesetzt werden. Waben, die während der Behandlung mit Thymovar® im Brutraum waren, dürfen im darauffolgenden

Produktinformation

Frühjahr nicht geschleudert werden.

Aufwandmenge

Eine Packung enthält 2 x 5 Streifen, ausreichend für: 10 Völker (einzargig) oder 5 Völker (zweizargig) oder 6 Völker (Dadant)

Anwendungszeitraum

Empfohlen werden zwei Behandlungen zwischen Juli und September

Zulassung-Nr.: 835495 | Tierarzneimittel zur Varroa- Sommerbehandlung der Honigbiene